

ประเทศไทยสามารถพบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั่วประเทศ โดยผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้ากว่าร้อยละ ๕๐ ติดเชื้อจากสัตว์ที่มีเจ้าของ เนื่องจากการเลี้ยงแบบปล่อยทำให้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสได้รับเชื้อจากการถูกสัตว์ติดเชื้อมัด ข่วน หรือเลีย กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘) นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ประเทศไทยมีรายงานการพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ๒ ราย ที่จังหวัดชลบุรีและศรีสะเกษ ทั้ง ๒ ราย ถูกสุนัขกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค และมีการรับเลี้ยงสุนัขจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ในปีนี้มีการพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน ๕๔ ตัว จากการส่งตรวจทั้งหมด ๘๓๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ พบสัตว์ติดเชื้อมากที่สุด ๓ อันดับ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น และมหาสารคาม โดยมีการพบเชื้อในสุนัขมากถึงร้อยละ ๗๕.๙๓ รองลงมา ได้แก่ โค กระบือ และแมว คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖ และ ๗.๔๑ ตามลำดับ กรมปศุสัตว์จึงได้ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์ให้ได้ภายใน ๓๐ วัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากสัตว์ไปยังพื้นที่อื่น และให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตนเอง ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก และสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทำได้โดยการใช้คากา ๕ ย. ได้แก่ “อย่าแห่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง” อย่าเหยียบให้สุนัขโมโห อย่าเหยียบสุนัข หรือทำให้สุนัขตกใจ อย่าแยกสุนัขที่กำลัง กัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบขามอาหารขณะสุนัขกำลังกิน และอย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านหรือที่ไม่ทราบประวัติ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์ที่เสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือดื่มน้ำนมสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

นายแพทย์ภาณุมาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนถูกสุนัข กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบ “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามือ ฉีดวัคซีนให้ครบ” คือ ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำ และสบู่ นาน ๑๐ - ๑๕ นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อ รีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด กักสัตว์เพื่อดูอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน หากสัตว์เสียชีวิตให้ส่งสัตว์ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ผู้เลี้ยงควรนำสุนัข และแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์อยู่สูงถึงระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ในแต่ละปีจะมีการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ ทุกชีวิต



โรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)
 เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระแต ลิง ชะนี วัว และควาย เป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข

การติดต่อ

- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน
- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้เลียหรือน้ำลายสัตว์ กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วน หรือ จมูก ปาก และตา
- ✓ ติดต่อดูโดยการหายใจ มักเกิดจากมีจำนวนไวรัสในอากาศเป็นจำนวนมาก เช่น ในถ้ำค้างคาว
- ✓ ติดต่อดูโดยการกินเนื้อสัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า

อาการป่วย ที่พบในคน


มีไข้


เจ็บคอ


อ่อนเพลีย


คันบริเวณแผล


กลัวแสง / กลัวลม


เบื่ออาหาร


กระวนกระวาย


กลัวน้ำ


หนาวสั่น


หายใจขัด



เสียชีวิต

*** ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
คิดซื้อแสดงอาการ
เสียชีวิตทุกราย

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข





คำแนะนำ เมื่อ ถูกกัด ข่วน เลีย

คำแนะนำเมื่อถูกกัด ข่วน เลีย


ล้างแผล
 ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง


ใส่ยา
 ใส่ยาบาดทะยัก
บริเวณที่ถูกกัด ข่วน


กักหมา และแมว
 เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตาย
ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า

ไปพบแพทย์
 เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
และมาตรฐานทุกครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง

- ✓ นำสุนัข หรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ✓ เลี้ยงในรั้วบ้าน ออกนอกบ้านต้องใช้สายลากลูง
- ✓ ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
- ✓ ทำหมันสุนัข/แมว

ฉีดวัคซีน
 วัคซีนต้องให้ครบชุด
และตรงตามนัด

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



